

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈՁԻ ՄԱՍԻՆ


Հետքուհական ուսումնակրթական ծրագրերի փորձագետ,
ավագ կլինիկական մասնագետ
դոց. Լ.Թ. Նիկոլայան

Վարակը տարածվում է հետևյալ ուղիներով



- ՏԲ-ի փոխանցման հիմնական ճանապարհը օդակաթիլայինն է
- Վարակի հիմնական աղբյուրը՝ թոքերի ՏԲ-ով հիվանդը, ով հազալիս, ծիծաղելիս կամ փռշտալիս արտազատում է ՏՄԲ պարունակող խորխի մանրիկ մասնիկներ:
- **1 տարում** ՏԲ-ով հիվանդը կարող է վարակել **15-20 մարդու**.
- Վարակը կարող է փոխանցվել է նաև *M.bovis*-ով վարակված կաթի միջոցով:





- 1-5 մկմ տրամագծով մասնիկները կաթիլային կախույթ են կազմում, որը, շրջակա պայմաններից կախված, կարող է մի քանի ժամ պահպանվել օդում:


Վարակմանը նպաստում են



- մարդկանց սերտ շփումը



- Շփման տևողությունը



- Մանրէազատման զանգվածի չափը

Վարակման հետևանքները

1. մեծամասամբ (80-90%) վարակը հիվանդության չի վերածվում, այլ ձևավորվում է գաղտնի SF, ինչի վկայությունը դրական տուբերկուլինային փորձն է (Մանթոլ)
2. վարակից հետո անմիջապես հիվանդությունն է զարգանում
3. վարակից հետո հիվանդությունն է զարգանում ոչ թե անմիջապես, այլ 10-նյակ տարիներ անց

Խոցելի են




1. Ոգելից խմիչքը
չարաշահողներ
2. դատապարտյալներ
3. թմրամոլներ
4. գործազուրկներ
5. անօթևաններ
6. փախստականներ




ՏԲ- ի ախտանիշերը

- երկարատև (3շաբաթ և ավելի տևողությամբ) խորխարտադրությամբ ընթացող հազ,
- հևոց,
- ցավ կրծքավանդակում
- արյունախիտում
- ինքնաթուևավորման համախտանիշ (37-37.5°C ջերմություն՝ 3 շաբաթ և ավելի տևողությամբ, թուլություն, դյուրհոգնածություն, գիշերային քրտնարտադրություն, ախորժակի կորուստ, մարմնի զանգվածի նվազում)



Հոդացավեր, քայլվածքի
փոփոխություն



գոտկացավեր, միզարձակման
խանգարում, մեզուլ
փոփոխություններ



Սեռական օրգանների ՏԲ՝
չբերություն



Տեսողության նվազում



Ավշահանգույցների մեծացում

Նման
գանգատներ
րով
անձինք
պետք է
դիմեն
բժշկի, ով
ՏԲ
կկասկածի

ՏԲ-ի ԲՈՒԺՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՍԽԱԼ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

- ▶ Բուժվում է ժողովրդական միջոցներով **X**
- ▶ Ինքնուրույն կանցնի **50x50**
- ▶ Կարելի է ընդհատել, հետո շարունակել **X**
- ▶ Կարելի է ընդհատել լավանալուց կամ բացիլազատումը դադարելուց հետո
- ▶ Ծանր են կողմնակի երևույթները դեղորայքից «կործանվում են այլ օրգանները» **X**
- ▶ 1-ին շարքի դեղորայքը թույլ է և ավելի թունավոր **50x50**
- ▶ **X**